



Warszawa, 07.11.2022 r.

## **Stanowisko w sprawie odstępów pomiędzy świadczeniami z zakresu profilaktyki fluorkowej metodą aplikacji lakieru fluorowego a metodą nadzorowanego szczotkowania zębów**

W porozumieniu z **prof. dr hab. n. med. Dorotą Olczyk Kowalczyk**, Konsultantką Krajową w dziedzinie stomatologii dziecięcej i **prof. dr hab. n. med. Agnieszką Mielczarek**, Konsultantką Krajową w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją uprzejmie informujemy, że prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych powinno odbywać się z zachowaniem kilkudniowego odstępu po aplikacji lakieru fluorowego.

Przy planowaniu poszczególnych etapów ww. procedury należy kierować się zaleceniami producenta zawartymi w ulotce do stosowanego produktu.

W związku z powyższym w roku szkolnym 2022–2023 należy realizować procedurę profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów zgodnie z obowiązującymi standardami:

[2020 Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej – Medycyna Szkolna – Instytut Matki i Dziecka \(imid.med.pl\)](#) - Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej 2020 – publikacja do pobrania na stronie internetowej [www.medycynaszkolna.pl](http://www.medycynaszkolna.pl) > Do pobrania >> Wydawnictwa i publikacje >>> 2020 Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej

Załącznik1: pismo od Konsultantów Krajowych



KONSULTANT KRAJOWY

W DZIEDZINIE  
STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ

*prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek*  
Zakład Stomatologii Zachowawczej Wydział Lek.-Stom. WUM

Tel. 22 116 64 46  
02-097 Warszawa, ul. Binińskiego 6  
WLS1/KK/45/22

e-mail: agnieszka.mielczarek@wum.edu.pl  
e-mail: sekretariat.zachowawcza@wum.edu.pl

Warszawa dnia, 03.11.2022r.

Sz. Pan  
Tomasz Mikołaj Maciejewski  
Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka  
ul. Kasprzaka 17A,  
01-211 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do pisma dotyczącego prawidłowego sposobu realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu profilaktyki fluorkowej u dzieci, uprzejmie informujemy, że multiplikowanie metod fluoryzacji nie przynosi dodatkowych korzyści terapeutycznych. Jednocześnie, w polskich realiach równoległe, zgodne z zaleceniami producenta użycie dodatkowych źródeł fluor nie stanowi zagrożenia.

Obecnie u dzieci zaleca się 2-4 krotną aplikację lakieru fluorowego o wysokiej zawartości fluor (22600ppm F) w zależności od ryzyka próchnicy. Stosowanie innych form profilaktyki endo i egzogennej powinno być odroczone na kilka dni po użyciu lakieru.

Z wyrazami szacunku,

**KONSULTANT KRAJOWY**  
*w dziedzinie*  
**stomatologii zachowawczej**

*prof. dr hab. n. med. Dorota Okczak-Kowalczyk*

**KONSULTANT KRAJOWY**  
*w dziedzinie*  
**stomatologii zachowawczej z endodoncją**  
*prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek*



**Instytut  
Matki i Dziecka**

**Pracownia Medycyny Szkolnej  
Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD**

---